


**Credem în tehnologie,  
credem în InSun™**

**ACORDIS  
CLP**

## **Hibrid de floarea-soarelui Clearfield® Plus semitardiv cu producții ridicate și un pachet complet de toleranțe la boli**



- **Hibrid cu conținut ridicat de ulei**, pentru tehnologie intensivă
- **Toleranță genetică la orobanche (A → F)**
- Hibrid foarte viguros **cu o dezvoltare rapidă în primăvară**
- **Pachet solid de toleranțe la boli**
- **Caracteristicile plantelor**
  - Vogoare timpurie: Excelentă
  - Înălțimea plantei: Înaltă
  - Toleranță la cădere: Ridicată
- **Control puternic și flexibil al buruienilor** prin utilizarea erbicidului Pulsar® Plus
  - Doza de aplicare a erbicidului Pulsar® Plus poate fi adaptată în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, nivelul de infestare și de prezența buruienilor greu de combătut
  - Combatere robustă și de încredere a buruienilor în postemergență



Acest hibrid a fost calificat ca hibrid Clearfield® Plus, tolerant la erbicidul Pulsar® Plus. El a fost testat în programul BASF de calificare a hibridilor. Folosirea altor erbicide din grupa B HRAC care nu au fost testate în programul de calificare se face pe riscul fermierului (acesta își asumă responsabilitatea, inclusiv în cazul distrugerii culturii)

Respectați recomandările BASF privind bunele practice de utilizare pentru sistemul Clearfield® Plus pentru a asigura o bună eficacitate în combaterea buruienilor și păstrarea beneficiilor sistemului pe termen lung.



**Clearfield® Plus**  
Sistem de producție pentru floarea-soarelui

**BASF**  
We create chemistry

# Credem în tehnologie, credem în InSun™

## ACORDIS CLP

### ACORDIS CLP Profilul hibridului

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Toleranță la Orobanche | A  F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Caracteristici        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maturitate            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vigoare timpurie      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Momentul înfloritului |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Înălțimea plantei     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Toleranță la cădere   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Conținut de ulei      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



| Rezistență la boli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verticillium       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Phomopsis          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sclerotinia        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Macrophomina       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Alternaria         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Puccinia           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

1 scăzut, 9 ridicat

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Managementul culturii | Intensiv |
|-----------------------|----------|

### Recomandări

| Densitate recomandată (semințe germinabile/ha) |                 |
|--|-----------------|
| Pe soluri fertile                              | 60 000 – 65 000 |
| Pe soluri sărace și umiditate scăzută          | 55 000 – 60 000 |



**Clearfield® Plus**  
Sistem de producție pentru floarea-soarelui

**BASF**  
We create chemistry