

Chlormequat-chlorid 750

Regulator de creștere

Destinat pentru culturile cerealiere spicoase.

FORMA PREPARATIVĂ: Concentrat solubil (SL)

SUBSTANȚA ACTIVĂ: Clorură de chlormequat, 750 g/l

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE: 7 ani.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 17-12-22-06-0248 din 22.12.2017

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII

TERMENUL DE VALABILITATE: 5 ani de la data producerii, în ambalaje originale nedeteriorate, la T -10°C pînă la +40°C.

ATENȚIE!

**ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONȚINUTULUI, CITIȚI ATENT ETICHETA
PERICULOS! OTRĂVITOR!**

Ambalaj: 10L

Numărul lotului și data producerii sunt indicate pe ambalaj

PRODUCĂTORUL:

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Germania

Tel.: +49 621 60-0,

Fax: +49 621 60-42525,

Număr internațional de urgență BASF: +49 180 22 73 112

E-mail: agro.service@basf.com

Distribuitorii oficiali BASF în Republica Moldova:

SA "Fertilitatea-Chișinău", tel: (022) 24 27 50

FPC „Veaces-Nova” SRL, tel: (022) 29 59 69

„Licorent Agro” SRL, tel: (249) 2 22 90

„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49

“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257

Pagina web: www.agro.basf.md

Chlormequat-chlorid 750

DE PĂSTRAT PREPARATUL ÎNCHIS, ÎNTR-UN LOC FERIT DE COPIII!

Citiți atent informația de pe ambalaj înainte de a utiliza preparatul.

Mecanismul de acțiune a preparatului:

Preparat cu acțiune sistemică. Regulator de creștere destinat culturilor de cereale spicoase produsul este rapid absorbit prin frunză, parțial prin sistemul radicular. Preparatul inhibă biosinteza acidului giberelic. Principalul efect al produsului Chlormequat-chlorid 750 este inhibarea alungirii celulelor la punctul de creștere al plantelor tratate, măbind rezistența mecanică a paiului, astfel sporește rezistența la cădere. Stimulează dezvoltarea mai puternică a sistemului radicular micșorînd astfel riscul afecțiilor radiculare de către boli. Mărește numărul de tulpini productive, asigură o înflorire uniformă a spicului, respectiv coacerea cît mai uniformă a boabelor în spicul principal, cît și a fraților. Simplificînd îngrijirea semănăturilor, reducînd pierderile la recoltare, asigurînd astfel realizarea cît mai mare a potențialului genetic al plantelor.

Momentul optim de aplicare, pentru obținerea efectului maxim de reglare a creșterii este faza începutul înfrățiri și pînă la sfîrșitul înfrățiri a culturii (BBCH 31-32).

Fitotoxicitatea:

Respectarea normelor de utilizare a preparatului exclude fitotoxicitatea.

Nu se va aplica cînd semănăturile sunt slab asigurate cu îngrășăminte minerale, cît și în cazul condițiilor de secetă sau îngheț.

Stropirea:

Stropirea se efectuează cu ajutorul unei stropitori tractate sau automate.

Înainte de a începe lucrul e necesar de a vă asigura că stropitoarea este curată și să o reglați pentru o stropire uniformă. La finele lucrului e necesar de a spăla foarte bine cu apă toate detaliile stropitorii.

Pregătirea soluției:

Turnați în rezervorul stropitorii 2/3 apă curată. Adăugați cantitatea necesară de preparat. În timpul umplerii rezervorului și pînă la finele stropirii amestecați intens soluția.

Soluția pentru stropire se va folosi imediat după pregătire.

Norma de consum a soluției (în dependență de cultură) este de 200-300 l/ha.

Ambalajele goale vor fi distruse în acord cu reglementările în vigoare.

Termenul de ieșire în cîmp:

Termenul de ieșire în cîmp – 3 zile pentru lucrări mecanizate.

Compatibilitate cu alte preparate:

Preparatul poate fi folosit în amestec cu fungicide, insecticide (în afară de insecticidele fosforo-organice), erbicide în deosebi Dianat®, Basagran®, Basagran® M și altele (în fiecare caz aparte este necesar de a efectua testul de compatibilitate).

În combinație cu erbicidele hormonale este necesar de a micșora norma de consum a erbicidului cu 10-15%.

Combinarea preparatului cu erbicide la cultura ovăzului – este interzisă.

Măsuri de protecție:

Se recomandă de a folosi echipamentul de protecție: respiratoare, ochelari, mănuși de cauciuc, haine și încălțăminte de protecție.

Mîinile se vor spăla înainte de pauză și imediat după sfîrșitul lucrului cu preparatul.

Se interzice de a mîncă, bea și fuma în timpul lucrului.

Preparatul se va păstra izolat de produsele alimentare, băuturi și hrana pentru animale.
Categoriza de toxicitate acută 3 - H301. Toxic în caz de înghițire.

Acordarea primului ajutor medical:

Persoanele care prezintă simptome (greață, vomă, dureri de cap și altele.), scoateți persoana vătămată din zona de lucru, acordați-i primul ajutor medical.

Persoana vătămată trebuie eliberată de îmbrăcămintea de lucru. Dacă nu există nici un pericol de contact a preparatului cu pielea sau căile respiratorii – îndepărtați cu grijă îmbrăcămintea contaminată și respiratorul de la persoana vătămată.

În caz de contact cu pielea: spălați intensiv pielea cu o cantitate mare de apă curgătoare sau ștergeți cu bumbac, atent fără a fricționa în piele, apoi spălați cu apă sau cu o soluție slabă de bicarbonat de sodiu.

În caz de contact cu ochii: spălați imediat cu apă curată curgătoare sau 2 % de soluție de bicarbonat de sodiu.

În caz de ingerare: este necesar ca victima să bea câteva pahare cu apă sau soluție de permanganat de calciu de o culoare roză pal și provocați voma. De repetat de câteva ori. După care persoanei vătămate se dă un pahar cu apă, în care să se agită 4-5 tablete de carbolen sau cărbune activ (2 linguri), și apoi 20 g de sare Glauber sau de sulfat de magneziu la 1/2 pahar de apă.

După acordarea primului ajutor, persoana afectată va fi transportată la spital.

Tratament simptomatic. Nu se cunoaște un antidot specific.

Păstrarea și transportarea preparatului:

Păstrați preparatul în ambalajul original, bine închis, într-o încăpere bine aerisită, în loc ferit de razele solare și la o temperatură de la -10°C până la +40°C.

Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact împreună cu alte preparate.

Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului:

Apă, substanțe uscate pentru stingerea focului, CO₂, spumă.

În atenția utilizatorilor:

Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediu înconjurător se recomandă respectarea instrucțiunilor de folosire a preparatului. Producătorul nu se face responsabil pentru daunele și consecințele în rezultatul păstrării și utilizării inadecvate a preparatului, ce nu corespund cerințelor de pe ambalaj și instrucțiunilor de utilizare a preparatului.

Pentru informații suplimentare referitoare la preparat vă rugăm să vă adresați la adresa și/sau telefonul indicate pe ambalaj.

Indicații generale de utilizare / responsabilitatea producătorului:

Aceste instrucțiuni se bazează pe experiența acumulată de utilizare a produsului și legislația în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligația de a face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența anumitor factori ce condiționează utilizarea produsului conform destinației.

Întrucât producătorul nu poate influența condițiile de păstrare și utilizare a produsului și nu poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecințele păstrării și folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul.

Modul de acțiune al produsului și efectul utilizării acestuia în alte domenii de producție, precum și asupra unor culturi care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni nu este cunoscut.

Producătorul nu va fi responsabil pentru cazurile de utilizare a produsului în domenii și moduri care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni. Responsabilitatea producătorului pentru eventualele consecințe ale utilizării produsului în domenii și moduri, altele decât cele indicate în aceste instrucțiuni, este exclusă.

Eficacitatea produsului este influențată de diverși factori, determinați de specificul local și regional, precum: condițiile pedoclimaterice, specificul soiurilor, rotația culturilor, termenii de tratare, doza de aplicare, interacțiunea cu alte produse și îngrășăminte (ce nu au fost indicate în instrucțiunile de mai sus), existența organismelor rezistente la substanța activă (agenți patogeni, plante (buruieni), insecte și alte organisme), tehnica necorespunzătoare sau care nu a fost bine adaptată pentru utilizare etc. Prezența unor asemenea factori nefavorabili, care nu au fost luați în considerare de utilizator poate determina modificarea eficienței produsului sau prejudicierea plantelor de cultură. Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru consecințele prezenței unor factori nefavorabili apăruiți în procesul de utilizare a produsului, potrivit celor menționate mai sus.

Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate la utilizarea, păstrarea și transportarea produselor de uz fitosanitar achiziționate, precum și pentru respectarea legislației în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor produse.

Normele de utilizare a preparatului Chlormequat-chlorid 750 în Republica Moldova:

Cultura	Norma de consum a produsului (l/ha)	Spectrul combaterii	Modul, perioada și limitele de utilizare	Termenul ultimului tratament (zile pînă la recoltare)	Numărul maxim de tratamente
Ceraliere spicoase	1,5	Retardant (sporește rezistența plantelor la polignire)	Prin stropirea Semănăturilor în faza sfârșitul fazei de înfrățire a culturii	-	1