

Pictor®

FUNGICID

Destinat combaterii unui spectru de boli la rapiță și floarea soarelui

FORMA PREPARATIVĂ: Suspensie concentrată (SC)

SUBSTANȚA ACTIVĂ: Boscalid, 200 g/l + Dimoxistrobin, 200 g/l

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE: 7 ani

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: Nr. 17-12-22-02-0240 din 22.12.2017

ATENȚIE!

**ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONȚINUTULUI, CITIȚI ATENT ETICHETA
PERICULOS! OTRĂVITOR!**

Ambalaj: 5 L

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII

TERMENUL DE VALABILITATE: 5 ani de la data producerii în ambalaje originale, nedeteriorate; temperatura de păstrare: de la 0°C până la +40°C.

Numărul lotului și data producerii sunt indicate pe ambalaj

PRODUCĂTORUL:

BASF SE,

67056 Ludwigshafen, Germania

Tel.: +49 621 60-27434, Fax: +49 621 60-6627434

Număr internațional de urgență BASF: +49 180 22 73 112

E-mail: agro.service@basf.com

Distribuitorii oficiali BASF în Republica Moldova:

SA "Fertilitatea-Chișinău", tel: (022) 24 27 50

FPC „Veaces-Nova” SRL, tel (022) 29 59 69

„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49

„Licorent Agro” SRL, tel: (249) 2 22 90

“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257

Pagina web: www.agro.basf.md

® = marcă înregistrată BASF

Pictor®

PREPARATUL SE VA PĂSTRA ÎNCHIS, ÎNTR-UN LOC FERIT DE COPII!

Citiți atent informația de pe ambalaj înainte de a utiliza preparatul.

Mecanismul de acțiune a preparatului:

Boscalid - substanță cu acțiune de sistemă. Absorbită parțial în plantă și se distribuie translaminar în țesuturile plantei. O parte a substanței active sistemic (acropetal) se extinde la partea superioară a lamei frunzei. Boscalid blochează schimbul de substanță a ciupercii, în rezultat se stopează aprovizionarea cu energie și dezvoltarea noilor părți ale ei.

Dimoxistrobin - formează pe suprafața plantei rezeve durabile de substanță activă. Substanța activă este eliberată în continuu și este distribuită timp de câteva săptămâni. Dimoxistrobin uniform distribuită pe toată suprafața plantei și parțial în interiorul plantei (translaminar) asigurând protecția plantei pe termen lung.

Fitotoxicitatea:

Respectarea normelor de utilizare a preparatului exclude fitotoxicitatea.

Stropirea:

Stropirea se efectuează cu ajutorul unei stropitori tractate sau automate. Înainte de a începe lucrul e necesar de a vă asigura că stropitoarea este curată și să o reglați pentru o stropire uniformă. La finele lucrului e necesar de a spăla foarte bine cu apă toate detaliile stropitorii.

Pregătirea soluției:

Turnați în rezervorul stropitorii 2/3 apă curată. Adăugați cantitatea necesară de preparat. În timpul umplerii rezervorului și până la finele stropirii amestecați intens soluția.

Soluția pentru stropire se va folosi imediat după pregătire.

Norma de consum a soluției este de 100-400 l/ha.

Numărul maxim de tratamente – 2.

Ambalajele goale sunt distruse în acord cu reglementările în vigoare.

Interacțiunea cu alte preparate:

În caz de necesitate poate fi folosită în amestec cu alte preparate de uz fitosanitar (în cazuri aparte e necesar de a efectua testul de compatibilitate).

Măsuri de protecție:

Se recomandă de a folosi echipamentul de protecție: respiratoare, ochelari, mănuși de cauciuc, haine și încălțăminte de protecție.

Măinile se vor spăla înainte de pauză și imediat după sfârșitul lucrului cu preparatul.

Se interzice de a mânca, bea și fuma în timpul lucrului.

Preparatul se va păstra izolat de produsele alimentare, băuturi și hrana pentru animale.

Termenul de ieșire în câmp:

Pe terenurile tratate pentru efectuarea lucrărilor mecanizate peste 4 zile, pentru efectuarea lucrărilor manuale – nu este relevant.

Acordarea primului ajutor medical:

Persoanele care prezintă simptome (greață, vomă, dureri de cap și altele.), scoateți persoana vătămată din zona de lucru, acordați-i primul ajutor medical.

Persoana vătămată trebuie eliberată de îmbrăcăminte. Dacă nu există nici un pericol de contact a preparatului cu pielea sau căile respiratorii – îndepărtați cu grijă îmbrăcămintea contaminată și respiratorul de la persoana vătămată

În caz de inhalare: încetați lucrul, scoateți persoana vătămată din zona de lucru, acordați-i primul ajutor și adresați-vă imediat medicului.

În caz de contact cu pielea: spălați intensiv pielea cu o cantitate mare de apă curgătoare sau ștergeți cu bumac, atent fără a fricționa în piele, apoi spălați cu 5-10 % Amoniac concentrat (Hidroxid de amoniu), în caz de necesitate, adresați-vă medicului.

În caz de contact cu ochii: spălați imediat cu apă curată curgătoare și adresați-vă imediat medicului.

În caz de ingerare: este necesar ca victima să bea câteva pahare cu apă și cărbune activ apoi provocați voma. De repetat de câteva ori pînă la înlăturarea preparatului din organism. După care victimei se dă un pahar cu apă, în care să se agită 4-5 tablete de carbolen sau cărbune activ (2 linguri), și apoi 20 g de sare Glauber sau de sulfat de magneziu la 1/2 pahar de apă. După acordarea primului ajutor, persoana afectată va fi transportată la spital.

Păstrarea și transportarea preparatului:

Păstrați preparatul aparte de alte produse inclusiv furaje. Se va păstra în ambalajul original, închis ermetic, într-un depozit special amenajat cu o temperatură de la 0°C pînă la +40°C.

În cazul păstrării și utilizării preparatului conform normelor, nu sunt necesare măsuri speciale de siguranță. A se feri de umezeală. A se păstra departe de sursele de căldură. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se păstra în locuri ferite de îngheț.

Se interzice de a transporta preparatul împreună cu produsele alimentare, produsele de larg consum și hrana pentru animale. Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact împreună cu alte preparate.

Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului:

Apă, substanțe uscate pentru stingerea focului, spumă.

În atenția consumatorului:

Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediu înconjurător se recomandă respectarea instrucțiunilor de folosire a preparatului. Producătorul nu se face responsabil pentru daunele și consecințele în rezultatul păstrării și utilizării inadecvate a preparatului, ce nu corespund cerințelor de pe ambalaj și instrucțiunilor de utilizare a preparatului Pictor®.

Pentru informații suplimentare referitoare la preparatul Pictor® vă rugăm să vă adresați solicitantului la adresa și telefonul indicate pe ambalaj.

Indicații generale de utilizare / responsabilitatea producătorului:

Aceste instrucțiuni se bazează pe experiența acumulată de utilizare a produsului și legislația în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligația de a face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența anumitor factori ce condiționează utilizarea produsului conform destinației.

Întrucît producătorul nu poate influența condițiile de păstrare și utilizare a produsului și nu poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecințele păstrării și folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea și utilizarea

necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul.

Modul de acțiune al produsului și efectul utilizării acestuia în alte domenii de producție, precum și asupra unor culturi care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni nu este cunoscut. Producătorul nu va fi responsabil pentru cazurile de utilizare a produsului în domenii și moduri care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni. Responsabilitatea producătorului pentru eventualele consecințe ale utilizării produsului în domenii și moduri, altele decât cele indicate în aceste instrucțiuni, este exclusă.

Eficacitatea produsului este influențată de diverși factori, determinați de specificul local și regional, precum: condițiile pedoclimaterice, specificul soiurilor, rotația culturilor, termenii de tratare, doza de aplicare, interacțiunea cu alte produse și îngrășăminte (ce nu au fost indicate în instrucțiunile de mai sus), existența organismelor rezistente la substanța activă (agenți patogeni, plante (buruieni), insecte și alte organisme), tehnica necorespunzătoare sau care nu a fost bine adaptată pentru utilizare etc. Prezența unor asemenea factori nefavorabili, care nu au fost luați în considerare de utilizator poate determina modificarea eficienței produsului sau prejudicierea plantelor de cultură. Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru consecințele prezenței unor factori nefavorabili apăruiți în procesul de utilizare a produsului, potrivit celor menționate mai sus.

Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate la utilizarea, păstrarea și transportarea produselor de uz fitosanitar achiziționate, precum și pentru respectarea legislației în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor produse.

Normele de utilizare a preparatului Pictor® în Republica Moldova:

Cultura	Norma consumului preparatului, l/ha	Spectrul combaterii	Modul, perioada de utilizare	Termenul de așteptare (zile pînă la strîngerea roadei)	Numărul maximal de tratamente
Rapiță	0,5	<i>Alternaria brassicae</i> - <i>Alternaria Sclerotinia sclerotiorum</i> - Putregai alb <i>Phoma lingam</i> - Fomoza	Prin stropire toamna în faza de 4-6 frunze ale culturii și primăvara la începutul butonizării	15	2
Floarea soarelui	0,5	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - Putregai alb <i>Phoma macdonaldii</i> - Fomoza <i>Alternaria helianthi</i> - <i>Alternaria</i>	Prin stropire în perioada de vegetație	15	2