Sercadis® Plus

Fungicid

Preparat destinat protecției mărului, perelor, tomatelor, cartofului, ardeiului, vinetelor, castraveților și pepenelui verde contra unui complex de ciuperci patogene.

Forma preparativă: Suspensie concentrată (SC)

Substanțe active: Difenoconazol, 50,0 g/l + Fluxapiroxad, 75,0 g/l

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE: 7 ani.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: Nr. 17-03-10-02-0076 din 10.03.2017 și 27.03.2019

PĂSTRAŢI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII

TERMENUL DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii, în ambalaje originale nedeteriorate, la T -5°C pana la +40°C.

ATENŢIE!
ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA
PERICULOS! OTRĂVITOR!

Ambalaj: 5 L

Numărul lotului şi data producerii sunt indicate pe ambalaj
PRODUCĂTOR:
BASF Agro B.V., Elveția.
Tel.: 0041-44-781 99 11
Număr internațional de urgență BASF:
+49 180 22 73 112
E-mail: agro.service@basf.com

Distribuitorii oficiali BASF in Republica Moldova:
SA “Fertilitatea-Chişinău”, tel: (022) 24 27 50
FPC „Veaces-Nova” SRL, tel: (022) 29 59 69
„Licorent Agro” SRL, tel: (249) 2 22 90
„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49
“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257
Pagina web: www.agro.basf.md
® = marcă înregistrată BASF

Sercadis® Plus
DE PĂSTRAT PREPARATUL ÎNCHIS, ÎNTR-UN LOC FERIT DE COPII!
Citiţi atent informaţia de pe ambalaj înainte de a utiliza preparatul.

Mecanismul de acţiune a preparatului:
Preparat cu acțiune sistemică, care combină două substanţe active cu diferite mecanisme de acțiune - Fluxapiroxad și Difenoconazol.
Fluxapiroxad - posedă acţiune preventivă şi curativă. Inhibă răspîndirea sporilor, alungirea tubului germinativ, opreşte creşterea miceliului şi formarea sporilor (acţionează la toate etapele de bază ce determină creşterea şi înmulţirea patogenului).
Difenoconazol - fungicid sistemic din grupa triazolilor, controlează un spectru larg de patogeni ale frunzelor, seminței și solului, din încrengătura Ascomycota, Basidiomycota și Deuteromycota. Substanța asigură un control de lungă durată de atît preventiv cît și curativ în potriva unui spectru larg de boli.

Fitotoxicitatea:
Respectarea normelor de utilizare a preparatului exclude fitotoxicitatea.

Stropirea:
Stropirea se efectuează cu ajutorul unei stropitori tractate sau automate.
Înainte de a începe lucrul e necesar de a vă asigura că stropitoarea este curată şi să o reglați pentru o stropire uniformă. La finele lucrului e necesar de a spăla foarte bine cu apă toate detaliile stropitorii.

Pregătirea soluţiei:
Turnaţi în rezervorul stropitorii 2/3 apă curată. Adăugaţi cantitatea necesară de preparat.
În timpul umplerii rezervorului şi pînă la finele stropirii amestecaţi intens soluţia.
Soluţia pentru stropire se va folosi imediat după pregătire.
Norma de consum a soluţiei (în dependenţă de cultură) este de 200-1000 l/ha.
Ambalajele goale sunt necesar de distrus în acord cu reglementările în vigoare.

Compatibilitate cu alte preparate:
În caz de necesitate poate fi folosită în amestec cu alte preparate de uz fitosanitar (în cazuri aparte e necesar de a efectua testul de compatibilitate).

Măsuri de protecţie:
Se recomandă de a folosi echipamentul de protecţie: respiratoare, ochelari, mănuşi de cauciuc, haine şi încălţăminte de protecţie.
Mîinile se vor spăla înainte de pauză şi imediat după sfîrşitul lucrului cu preparatul.
Se interzice de a mînca, bea şi fuma în timpul lucrului.
Preparatul se va păstra izolat de produsele alimentare, băuturi şi hrana pentru animale.

Termenul de ieșire în cîmp:
Termenul de ieșire în cîmp - 3 zile pentru lucrări mecanizate. Lucrări manuale - 7 zile.

Acordarea primului ajutor medical:
Persoanele care prezintă simptome (greață, vomă, dureri de cap și altele.), scoateţi persoana vătămată din zona de lucru, acordaţi-i primul ajutor medical.
Persoana vătămată trebuie eliberată de îmbrăcămintea de lucru. Dacă nu există nici un pericol de contact a preparatului cu pielea sau căile respiratorii – îndepărtați cu grijă îmbrăcămintea contaminată și respiratorul de la persoana vătămată.
<u>În caz de contact cu pielea:</u> spălaţi intensiv pielea cu o cantitate mare de apă curgătoare sau ștergeți cu bumbac, atent fără a fricționa în piele, apoi spălați cu apă sau cu o soluție

slabă de bicarbonat de sodiu.
În caz de contact cu ochii: spălaţi imediat cu apă curată curgătoare sau 2 % de soluție de bicarbonat de sodiu.
În caz de ingerare: este necesar ca victima să bea cîteva pahare cu apă sau soluție de permanganat de calciu de o culoare roză pal și provocați voma. De repetat de câteva ori. După care persoanei vătămate se dă un pahar cu apă, în care să se agită 4-5 tablete de carbolen sau cărbune activ (2 linguri), și apoi 20 g de sare Glauber sau de sulfat de magneziu la 1/2 pahar de apă.
După acordarea primului ajutor, persoana afectată va fi transportată la spital.
Tratament simptomatic. Un antidot special nu este cunoscut.

Păstrarea şi transportarea preparatului:
Păstraţi preparatul în ambalajul original, bine închis, într-o încăpere bine aerisită, în loc ferit de razele solare directe şi la o temperatură de la -5°C pînă la +40°C.
Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact împreună cu alte preparate.

Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului:
Apă, substanţe uscate pentru stingerea focului, CO_2, spumă.

În atenţia consumatorului:
Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediu înconjurător se recomandă respectarea instrucțiunilor de folosire a preparatului. Producătorul nu se face responsabil pentru daunele şi consecinţele în rezultatul păstrării şi utilizării inadecvate a preparatului, ce nu corespund cerinţelor de pe ambalaj şi instrucţiunilor de utilizare a preparatului Sercadis® Plus.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la preparatul Sercadis® Plus vă rugăm să vă adresaţi producătorului la adresa şi telefonul indicate pe ambalaj.

Indicaţii generale de utilizare / responsabilitatea producătorului:
Aceste instrucțiuni se bazează pe experienţa acumulată de utilizare a produsului şi legislația în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligaţia de a face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența anumitor factori ce condiţionează utilizarea produsului conform destinației.
Întrucît producătorul nu poate influenţa condiţiile de păstrare şi utilizare a produsului și nu poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecinţele păstrării şi folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul.
Modul de acțiune al produsului și efectul utilizării acestuia în alte domenii de producție, precum și asupra unor culturi care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni nu este cunoscut. Producătorul nu va fi responsabil pentru cazurile de utilizare a produsului în domenii și moduri care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni. Responsabilitatea producătorului pentru eventualele consecinţe ale utilizării produsului în domenii și moduri, altele decît cele indicate în aceste instrucțiuni, este exclusă.
Eficacitatea produsului este influențată de diverşi factori, determinaţi de specificul local şi regional, precum: condiţiile pedoclimaterice, specificul soiurilor, rotaţia culturilor, termenii de tratare, doza de aplicare, interacţiunea cu alte produse şi îngrăşăminte (ce nu au fost indicate în instrucțiunile de mai sus), existenţa organismelor rezistente la substanţa activă (agenţi patogeni, plante (buruieni), insecte şi alte organisme), tehnica

necorespunzătoare sau care nu a fost bine adaptată pentru utilizare etc. Prezența unor asemenea factori nefavorabili, care nu au fost luați în considerare de utilizator poate determina modificarea eficienţei produsului sau prejudicierea plantelor de cultură. Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru consecințele prezenței unor factori nefavorabili apăruți în procesul de utilizare a produsului, potrivit celor menționate mai sus.
Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate la utilizarea, păstrarea şi transportarea produselor de uz fitosanitar achiziționate, precum şi pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor produse.

Normele de utilizare a preparatului Sercadis® Plus în Republica Moldova:

Cultura	Norma consumului preparatului, l/ha	Spectrul de boli	Modul, perioada de utilizare	Termenul de aşteptare (zile pînă la strîngerea roadei)	Numărul maxim de tratamente
Măr, păr	0,9-1,5	*Venturia spp.* – Rapăn *Podosphaera leucotricha* - Făinarea	Prin stropire în perioada de vegetaţie	30	2-3
Tomate	0,8	*Alternaria solani* – Alternarioza *Septoria lycopersici* – Septorioza, pătara frunzelor	Prin stropire în perioada de vegetaţie	3	3
Cartof	0,7 – 0,8	*Alternaria solani* - Alternarioza	Prin stropire în perioada de vegetaţie	3	2-3
Ardei	0,8	*Alternaria capsici-annui* - Alternarioza	Prin stropire în perioada de vegetaţie	3	2
Vinete	0,8	*Alternaria solani* - Alternarioza	Prin stropire în perioada de vegetaţie	3	3
Castraveţi	1,0	*Sphaerotheca fuliginea* - Făinare *Colletotrichum lagenarium* - Antracnoza *Ascochyta cucumis* - Ascohitoză *Sclerotinia sclerotiorum* – Putregai alb *Botrytis cinerea* – Putregai cenușiu	Prin stropire în perioada de vegetaţie	3	2
Pepene Verde (harbuz)	0,6	*Sphaerotheca fuliginea* - Făinare *Colletotrichum lagenarium* - Antracnoza *Ascochyta melonis* -	Prin stropire în perioada de vegetaţie	3	3

		Ascohitoză *Sclerotinia sclerotiorum* – Putregai alb *Botrytis cinerea* – Putregai cenușiu			