Sercadis®

Fungicid

Destinat pentru combaterea unui complex de boli ale viței de vie, mărului, piersicului și cartofului.

Forma preparativa: Suspensie concentrată, (SC)

Substanta activa: Fluxapiroxad, 300 g/l

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE: 7 ani
Certificat de omologare: Nr. 02-0491 din 10.02.2016 si 23.05.2019

PĂSTRAŢI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII

TERMENUL DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii în ambalaje originale, nedeteriorate; temperatura de păstrare: de la -10°C până la + 40°C.

ATENTIE!
ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONTINUTULUI, CITITI ATENT ETICHETA PERICULOS! TOXIC!

Ambalaj: 1L

Numărul lotului şi data producerii sunt indicate pe ambalaj

PRODUCĂTOR:
BASF SE
67056 Ludwigshafen, Germania
Tel.: +49 621 60 27 434, Fax: +49 621 60 6627434
Număr internațional de urgență BASF: +49 180 22 73 112
E-mail: agro.service@basf.com

Distribuitorii oficiali BASF in Republica Moldova:
SA “Fertilitatea-Chişinău”, tel: (022) 24 27 50
FPC „Veaces-Nova” SRL, tel: (022) 29 59 69
„Licorent Agro” SRL, tel: (249) 2 22 90
„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49
“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257
Pagina web: www.agro.basf.md
® = marca înregistrată BASF

Sercadis®
PREPARATUL SE VA PĂSTRA ÎNCHIS, ÎNTR-UN LOC FERIT DE COPII!
Citiţi atent informaţia de pe ambalaj înainte de a utiliza preparatul.

Mecanismul de acţiune a preparatului:
Datorită conţinutului de substanţă activă Fluxapiroxad, preparatul posedă acţiune preventivă şi curativă. Inhibă răspîndirea sporilor, alungirea tubului germinativ, opreşte creşterea miceliului şi formarea sporilor (acţionează la toate etapele de bază ce determină creşterea şi înmulţirea patogenului).

Fitotoxicitatea:
Respectarea normelor de utilizare a preparatului exclude fitotoxicitatea.

Stropirea:
Stropirea se efectuează cu ajutorul unei stropitori tractate sau autopropulsantă.
Înainte de a începe lucrul e necesar de a vă asigura că stropitoarea este curată şi să o reglaţi pentru o stropire uniformă. La finele lucrului e necesar de a spăla foarte bine cu apă toate detaliile stropitorii.

Pregătirea soluţiei:
Turnaţi în rezervorul stropitorii 2/3 apă curată. Adăugaţi cantitatea necesară de preparat.
În timpul umplerii rezervorului şi pînă la finele tratării amestecaţi intens soluţia.
Soluţia pentru stropire se va folosi imediat după pregătire.
Norma de consum a soluţiei (în dependenţă faza de dezvoltare a culturei) este de – 500-1000 l/ha.
Norma de consum a soluţiei de lucru – 10 l/t (tratarea în prealabil al tuberculilor, sau prin pulverizarea tuberculilor în timpul plantării).
Norma de consum a soluţiei de lucru: - 70-130 l/ha (tratarea în prealabil al tuberculilor, și prin stropirea solului în timpul plantării).
Ambalajele goale sunt necesar de distrus în acord cu reglementările în vigoare.

Interacţiunea cu alte preparate:
În caz de necesitate poate fi folosită în amestec cu alte preparate de uz fitosanitar (în cazuri aparte e necesar de a efectua testul de compatibilitate).
Măsuri de protecţie:
Se recomandă de a folosi echipamentul de protecţie: respiratoare, ochelari, mănuşi de cauciuc, haine şi încălţăminte de protecţie.
Mîinile se vor spăla înainte de pauză şi imediat după sfîrşitul lucrului cu preparatul.
Se interzice de a mînca, bea şi fuma în timpul lucrului.
Preparatul se va păstra izolat de produsele alimentare, băuturi şi hrana pentru animale.

Termenul de ieşire în cîmp:
Pe terenurile tratate pentru efectuarea lucrărilor mecanizate peste 3 zile, pentru efectuarea lucrărilor manuale - 7 zile.

Acordarea primului ajutor medical:

Persoanele care prezintă simptome (greață, vomă, dureri de cap și altele.), scoateţi persoana vătămată din zona de lucru, acordaţi-i primul ajutor medical.
Persoana vătămată trebiue eliberată de îmbrăcămintea de lucru. Dacă nu există nici un pericol de contact a preparatului cu pielea sau căile respiratorii – îndepărtați cu grijă îmbrăcămintea contaminată și respiratorul de la persoana vătămată.
În caz de contact cu pielea: spălaţi intensiv pielea cu o cantitate mare de apă curgătoare sau ștergeți cu bumbac, atent fără a fricționa în piele, apoi spălați cu apă sau cu o soluție slabă de bicarbonat de sodiu.
În caz de contact cu ochii: spălaţi imediat cu apă curată curgătoare sau 2 % de soluție de bicarbonat de sodiu.
În caz de ingerare: este necesar ca victima să bea cîteva pahare cu apă sau soluție de permanganat de calciu de o culoare roză pal și provocați voma. De repetat de căteva ori. După care persoanei vătămate se dă un pahar cu apă, în care să se agită 4-5 tablete de carbolen sau cărbune activ (2 linguri), și apoi 20 g de sare Glauber sau de sulfat de magneziu la 1/2 pahar de apă.
După acordarea primului ajutor, persoana afectată va fi transportată la spital.
Tratament simptomatic. Nu se cunoaşte un antidot specific.

Păstrarea şi transportarea preparatului:
Păstraţi preparatul izolat de alte produse şi hrana pentru animale. Se va păstra în ambalajul original, închis ermetic, într-un depozit special amenajat cu o temperatură de la -10°C pînă la +40°C. În cazul păstrării şi utilizării preparatului conform normelor, nu vor fi necesare măsuri speciale de siguranţă. A se feri de umezeală. A se păstra departe de sursele de căldură. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se păstra în locuri ferite de îngheţ. Se interzice de a transporta preparatul împreună cu produsele alimentare, produsele de larg consum şi hrana pentru animale. Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact împreună cu alte preparate.

Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului:
Apă, substanţe uscate pentru stingerea focului, CO_2, spumă.

În atenţia consumatorului:
Pentru a evita riscul de provocare a daunelor omului şi mediului înconjurător, e necesar de a respecta instrucţiunile de utilizare a preparatului. Producătorul nu se face responsabil pentru daunele şi consecinţele păstrării şi utilizării inadecvate a preparatului, ce nu corespund cerinţelor de pe ambalaj şi instrucţiunilor de utilizare a preparatului Sercadis®. Pentru informaţii suplimentare referitoare la preparatul Sercadis® vă rugăm să vă adresaţi producătorului la adresa şi telefonul indicate pe ambalaj.

Indicaţii generale de utilizare / responsabilitatea producătorului:
Aceste instrucțiuni se bazează pe experienţa acumulată de utilizare a produsului şi legislația în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligaţia de a face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența anumitor factori ce condiţionează utilizarea produsului conform destinației.
Întrucît producătorul nu poate influenţa condiţiile de păstrare şi utilizare a produsului și nu poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecinţele păstrării şi folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea

și utilizarea necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul.
Modul de acțiune al produsului și efectul utilizării acestuia în alte domenii de producție, precum și asupra unor culturi care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni nu este cunoscut. Producătorul nu va fi responsabil pentru cazurile de utilizare a produsului în domenii și moduri care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni. Responsabilitatea producătorului pentru eventualele consecinţe ale utilizării produsului în domenii și moduri, altele decît cele indicate în aceste instrucțiuni, este exclusă.
Eficacitatea produsului este influențată de diverşi factori, determinaţi de specificul local şi regional, precum: condiţiile pedoclimaterice, specificul soiurilor, rotaţia culturilor, termenii de tratare, doza de aplicare, interacţiunea cu alte produse şi îngrăşăminte (ce nu au fost indicate în instrucțiunile de mai sus), existenţa organismelor rezistente la substanţa activă (agenţi patogeni, plante (buruieni), insecte şi alte organisme), tehnica necorespunzătoare sau care nu a fost bine adaptată pentru utilizare etc. Prezența unor asemenea factori nefavorabili, care nu au fost luați în considerare de utilizator poate determina modificarea eficienţei produsului sau prejudicierea plantelor de cultură. Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru consecințele prezenței unor factori nefavorabili apăruți în procesul de utilizare a produsului, potrivit celor menționate mai sus.
Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate la utilizarea, păstrarea şi transportarea produselor de uz fitosanitar achiziționate, precum şi pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor produse.

Normele de utilizare a preparatului Sercadis® în Republica Moldova:

Cultura	**Norma de consum a preparatului, l/ha**	**Spectrul combateri**	**Modul, perioada de utilizare**	**Intervalul de pauză înainte de recoltare**	**Numărul maximal de tratamente**
Viţa-de-vie	0,1-0,24	*Uncinula necator* - Făinare	Prin stropire în perioada de vegetaţie	35	3
Cartof	0,2 l/t	*Rhizoctonia solani* - Rizoctonia	Tratarea tuberculilor pînă la plantare	-	1
Cartof	0,8 l/ha	*Rhizoctonia solani* - Rizoctonia	Aplicare în benzi sau rigole în timpul plantării cartofului (BBCH 00)	-	1
Piersic	0,15	*Sphaerotheca pannosa* - Făinare	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 53-81)	21	3
Măr	0,15	*Podosphaera leucotricha* - Făinare	Prin stropire în perioada de vegetaţie (BBCH 53-81)	35	3
	0,3	*Venturia inaequalis* - Rapăn			