

Storm® 4G BB

Biocid de tip rodenticid destinat combaterii șoarecilor de casă și șobolanilor (negri și bruni) în domeniul spații medicale, domeniul agricol (clădiri și depozite) și industriale, în sistem de deratizare (în jurul clădirilor, grădini)

Forma preparativă: Momeală gata de utilizare sub forma de brichete de 4 g de culoare albastră

Substanța activă: flocoumafen, 0.005 %

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE: Nr. 00285 din 22.06.2022, termen de înregistrare până la 22.06.2028.

CATEGORII DE UTILIZATORI: profesionali, industriali



Fraze de pericol

H360D Poate dăuna fătului.

H373 Poate produce leziuni organelor după expunerea prelungită sau repetată

Pericol

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P308 + P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația națională

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII

ATENȚIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONȚINUTULUI, CITIȚI ATENT ETICHETA PERICULOS! OTRĂVITOR!

Ambalaj: 1 KG

Lot nr.: vezi sus

Data fabricației: vezi sus

Termenul de valabilitate: 5 ani de la data fabricației

SOLICITANTUL ȘI PRODUCĂTORUL: BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Elveția.

Tel.: 0041-44-781 99 11

Fax: 0041-44-781 99 12

E-mail: agro.service@basf.com

Distribuitorii oficiali BASF în Republica Moldova:

SA "Fertilitatea-Chișinău", tel: (022) 24 27 50

FPC „Veaces-Nova” SRL, tel: (022) 29 59 69

„Licorent Agro” SRL, tel: (249) 2 22 90

„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49

“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257

Pagina web: www.agro.basf.md

® = marcă înregistrată BASF

Storm® 4G BB**Substanța activă:** flocoumafen, 0.005 %

Destinație Rodenticid anticoagulant destinat pentru combaterea șoarecilor de casă și șobolanilor (negri și bruni) în domeniul spații medicale, domeniul agricol (clădiri și depozite) și industriale, în sistem de deratizare (în jurul clădirilor, grădini)

Recomandări de utilizare

Activitate	Metoda de aplicare	Specia	Concentrații	Timpul de acțiune
La interior și la exterior în jurul clădirilor	Momeala este plasată în prealabil în zonele infectate: de-a lungul pereților, pereților despărțitori, momeala se amenajează în locuri uscate sub adăposturi (dulapuri, echipamente etc.) în containere adaptate (cutii de momeală, conducte de drenaj, tăvi, cutii etc.) sau în recipiente speciale.	Șoarecele de casă (<i>Mus musculus</i>)	Infecție puternică: 5 brichete (20g) la o distanță de 1m Infecție slabă: 5 brichete (20g) la o distanță de 2 m.	Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începutul tratamentului pentru șoareci și pentru șobolani la 5 – 7 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este consumată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta cadavrele. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
		Șobolanul brun (<i>Rattus norvegicus</i>)	Infecție puternică: 10-15 brichete (40-60 g) la o distanță de 5m Infecție slabă: 10-15 brichete (40-60 g) la o distanță de 10 metri	
		Șobolanul negru (<i>Rattus rattus</i>)		

Mod de utilizare: Momeala se repartizează manual în zonele infectate în cutii pentru momeală sau recipiente speciale. Perioada de utilizare a produsului – la apariția rozătoarelor. Cel mai mare consum de momeală se observă în termen de una până la două zile după repartizarea acesteia. Momelile sunt repartizate până la dispariția completă a rozătoarelor. Cantitățile de momeală consumate se înlocuiesc cu altele noi.

Mod de aplicare: Momeala este plasată în prealabil în zonele infectate: de-a lungul pereților, pereților despărțitori, lângă viziuni, momeala se amenajează în locuri uscate sub adăposturi (dulapuri, echipamente etc.) în containere adaptate (cutii de momeală, conducte de drenaj, tăvi, cutii etc.) sau în recipiente speciale. Acestea din urmă sunt de preferat pentru că crește gradul de consumabilitate al produsului, împiedicând să fie împrăștiate de rozătoare și, de asemenea, complică accesul la momeală pentru speciile de animale nețintă. Momelile pregătite trebuie așezate în locuri inaccesibile copiilor, animalelor de companie și animalelor de fermă, inclusiv: păsări, în locuri de depozitare deschise a alimentelor, apei și furajelor. Nu așezați momeala lângă bazinele de apă și sursele de alimentare cu apă.

Măsuri de protecție: Se recomandă a se folosi echipamentul de protecție: respiratoare, ochelari, mănuși de cauciuc, haine și încălțăminte de protecție. În timpul lucrului, este necesar să respectați regulile de igienă personală: este interzis să fumați, să beți, să mâncați. În pauze și după finalizarea lucrului, spălați-vă pe față și pe mâini cu apă caldă și săpun. Produsul se va păstra izolat de produsele alimentare, băuturi, țigări și hrana pentru animale. Persoanele care locuiesc sau lucrează în încăperile tratate trebuie să fie informate cu privire la tratamentul aplicat și respectarea măsurilor de precauție. Nu lăsați produsul să pătrundă în apele reziduale/de suprafață sau subterane și în canalizare. La terminarea tratamentului cu Storm 4G

BB se adună toate momelile neconsumate care se vor distruge conform legislației în vigoare (nu se vor arunca în locuri de depozitare a gunoiului menajer sau în bazinele de apă!). Deșeurile trebuie stranse în containere corespunzătoare și eliminate în conformitate cu prevederile legale. Dacă în timpul și după acțiunea de combatere vor fi găsiți șobolani sau șoareci morți, aceștia trebuie îndepărtați de îndată, pentru a preveni otrăviri secundare. Nu folosiți în spații deschise-acoperiți momeala sau utilizați cuști pentru momeală. Nu inspirați praful. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine.

Metode de acordare a primului ajutor medical: Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată.

În caz de inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistență medicală

În caz de contact cu pielea: Spălați imediat foarte bine cu apă și săpun, solicitați ajutor medical.

În caz de contact cu ochii: Spălați ochii afectați, cu pleoapele deschise, cel puțin 15 minute, sub curent de apă.

În caz de ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beți 200 -300 ml de apă, consultați medicul.

În atenția medicului: Substanța/ produsul este un anticoagulant rodenticid cu mod de acțiune de tip cumarinic.

Simptome: Tulburări de coagulare. Tendința crescută de sângerare. În cazuri severe, hemoragiile masive a organelor interne pot conduce la șoc circulator, care poate fi fatal. Debutul simptomelor este întârziat cu până la 4 zile după preluare.

Antidot: vitamina K1 (Fitomenadionă) și preparatele pe bază de aceasta substanță activă, administrarea sub supravegherea unui medic.

Păstrarea și transportarea preparatului: Păstrați preparatul în ambalajul original, bine închis, într-o încăpere bine aerisită, în loc ferit de razele solare și umiditate, destinate pentru păstrarea pesticidelor. Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact împreună cu alte preparate. Se interzice păstrarea și/sau transportarea preparatului împreună cu produsele alimentare și furajere. Sensibil la miros: separarea de produse ce emană mirosuri. A se păstra departe de caldură. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de temperaturi mai mari de 30°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. A se depozita sub cheie.

Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului: pudră pentru extingtor, spumă, pulverizare de apă

În atenția utilizatorilor: Producătorul garantează calitatea produselor sale și livrarea acestora în ambalaje originale. Pentru daunele cauzate în urma utilizării și stocării necorespunzătoare ale produsului producătorul nu poartă responsabilitatea.

Indicații generale de utilizare / responsabilitatea producătorului: Aceste instrucțiuni se bazează pe experiența acumulată de utilizare a produsului și legislația în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligația de a face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența anumitor factori ce condiționează utilizarea produsului conform destinației.

Întrucât producătorul nu poate influența condițiile de păstrare și utilizare a produsului și nu poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecințele păstrării și folosirii necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul.

Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru consecințele prezenței unor factori nefavorabili apăruiți în procesul de utilizare a produsului. Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate

la utilizarea, păstrarea și transportarea produselor achiziționate, precum și pentru respectarea legislației în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor produse.

